

## ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช สภากาชาดไทย ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โถงกลางอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

### คุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิต

- ๑.อายุระหว่าง ๑๗-๖๐ ปีบริบูรณ์
- ๒.น้ำหนัก ๔๕ กิโลกรัมขึ้นไป สุขภาพทั่วไปสมบูรณ์ดี
- ๓.ไม่มีประวัติเป็นโรคตับอักเสบ หรือดีซ่าน ตัวเหลือง ตาเหลือง
- ๔.ไม่เป็นไข้มาเลเรียมาในระยะ ๓ ปี ที่ผ่านมาและไม่เป็นกามโรค โรคติดเชื้อต่างๆ ไอเรื้อรัง ภูมิแพ้ โลหิต อกอักเสบ ผิดปกติ โรคเลือดต่างๆ โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ โรคลมชัก โรคผิวหนังเรื้อรัง โรคหัวใจ โรคไต โรคเบาหวาน โรคไทรอยด์
- ๕.ไม่อยู่ในระหว่างทานยาแก้อักเสบในระยะ ๗ วันที่ผ่านมา
- ๖.ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ หรือสำส่อนทางเพศ ไม่มีประวัติติดยาเสพติด
- ๗.งดการบริจาคโลหิตภายหลังผ่าตัด คลอดบุตรหรือแท้งบุตร ๖ เดือน (ถ้ามีการรับโลหิตมาต้องงดบริจาคโลหิต ๑ ปี)
- ๘.สตรีไม่อยู่ในระหว่างมีประจำเดือน หรือตั้งครรภ์

### ดูแลตัวเองก่อนมาบริจาคโลหิต

- ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย ๖ ชั่วโมง
- ควรมีความสุขสมบูรณ์ดีทุกประการ ไม่เป็นไข้หวัด
- ควรรับประทานอาหารมาก่อน และเป็นอาหารที่ย่อยง่ายไม่มีไขมัน
- งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนมาบริจาคอย่างน้อย ๒๔ ชม.
- งดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต ๑ ชั่วโมงเพื่อให้ปอดฟอกโลหิตได้ดี

### ข้อควรปฏิบัติหลังบริจาคโลหิต

- ๑.นอนพักบนเตียงสักครู่ ห้ามลุกจากเตียงทันทีจะเวียนศีรษะเป็นลมได้
- ๒.ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีบริการให้ และดื่มน้ำมากกว่าปกติเป็นเวลา ๑ วัน
- ๓.ไม่ควรรีบร้อนกลับควรนั่งพักจนแน่ใจว่าเป็นปกติ หากเวียนศีรษะให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ ทราบทันที
- ๔.รับประทานยาธาตุเหล็กที่ได้รับวันละ ๑ เม็ด จนหมดเพื่อป้องกันการขาดธาตุเหล็ก
- ๕.หลีกเลี่ยงการใช้กำลังแขนขาที่เจาะเป็นเวลา ๑๒ ชั่วโมง เพื่อป้องกันการบวมซ้ำ
- ๖.งดกิจกรรมที่ใช้กำลังและเสียเหงื่อที่ทำให้อ่อนเพลีย

### ผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบ ท่านที่มีประวัติดังต่อไปนี้ ควรงดการบริจาคโลหิตคือ

- มีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่ไม่ใช่คู่ของตน
- เคยเป็นผู้ที่เสพยาเสพติดโดยใช้เข็มฉีดยา
- รู้ตัวว่าติดเชื้อเอชไอวี

หลังจากร่างกายได้บริจาคโลหิตออกไปแล้ว ไช้กระดูกจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้าง เม็ดโลหิตขึ้นมาทดแทนให้มีปริมาณโลหิตในร่างกาย เท่าเดิม ซึ่งทั้งระยะไว้เพียง ๓ เดือน ผู้บริจาคโลหิตก็จะสามารถทำการบริจาคโลหิตได้อีกครั้งหนึ่ง

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวิมลลักษณ์ ชีรวังษ์ งานบริการสวัสดิการ โทร.๐๗๕-๖๗๓๑๔๗